Évaluation des risques du patient

Nom du clinicien : _____

Identité du patient : _____

Date de l'évaluation : _____ Date de la chirurgie : _____

Type de chirurgie : _____

L'évaluation des risques est déterminée en cochant les boîtes ci-dessous

1. Diabète ☐
2. Obésité ☐
3. ASA ≥ 3 ☐
4. Durée ☐ >120 min ☐ ≥ 75e percentile, <120 min
5. Planification de la chirurgie ☐ Urgent ☐ Émergent
6. Classe de contamination ☐ II ☐ III ☐ IV

☐ Les facteurs avec des boîtes **noires** contribuent à l'équation du risque

La sélection d'**un facteur** augmente le risque de **Faible** à **Modéré**

La sélection de **deux facteurs** augmente le risque de **Faible** à **Élevé**

La sélection de **trois facteurs** augmente le risque de **Faible** à **Haute**

☐ Chacun des facteurs avec une boîte **rouge** augmente le risque à un niveau **élevé**, indépendant d'autres facteurs.

Profil de risque

☐ Faible ☐ Modéré ☐ Élevé ☐ Haute

Pansement avancé	Pansement avancé Envisagez le ciNPT si l'avantage de coût permet	La thérapie par pression négative (ciNPT)
Mepilex® Border Post-Op		Avance® Solo

Traitement recommandé

Références:
SSERA Group (2023) Surgical patient population risk assessment: The simplified SSERA assessment model. Wounds International, London.

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, 2600 Berchem (Anvers), Tél: +32(0)3 286 89 50.
Les marques, noms et logos Mölnlycke, Avance et Mepilex sont déposés par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care pour le monde entier. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00012405

Mölnlycke®